

*ESPÈCES NOUVELLES DE SPOROBOLUS ET D'ERAGROSTIS  
(GRAMINÉES) DE L'OUEST ET DU CENTRE AFRICAIN*

Par Aug. CHEVALIER.

PROFESSEUR HONORAIRE AU MUSÉUM

Les deux genres *Sporobolus* et *Eragrostis* sont parmi les plus riches espèces de la famille des Graminées. Ces espèces vivent surtout dans les contrées tropicales des deux mondes. A côté des espèces ubiquistes ou pantropicales, on en compte un grand nombre d'endémiques, parfois très localisées en une région. Ce sont ou des paléo-endémiques ou des espèces en formation. En faisant la révision des espèces que nous avons récoltées en Afrique tropicale et en revoyant aussi quelques spécimens de l'Herbier africain au Muséum, nous avons distingué un certain nombre de formes qui nous ont paru constituer des espèces nouvelles. Nous en publions ci-après les diagnoses. Des descriptions en français avec des commentaires sur diverses espèces seront publiées prochainement dans la *Revue Internationale de Botanique Appliquée*.

*SPOROBOLUS* R. Br.

**S. praecox.** sp. nov.

*Annua; radice fibrosa; culmis pluribus erectis cæspitosis tereti-filiformis, 6-12 cm. altis, uti tota planta glaucescente; vaginis striatis, asperimis, puberulis; ore barbatulis, ligula ovata foliis erectis basi planis nec convolutis elongatis setaceis, coriaceis rugosis, facie superiore valde scabrido, marginis glanduloso-punctatis paniculæ jubatae augustissimæ spicæformis 3-4 cm. longis, 4-5 mm. latis; radiis 1-3 nis brevibus, erectis simplicibus 1-3 flores; spicula linea brevioribus acutis, glabris parvis albescentes, gluma inferiore ovalo valvulis dimidio breviore, valvulis acutis inæqualibus, fructo oblongo spadiceo.*

Guinée française : Labé à 250 m. alt., terrains arides et dénudés sur les bowals. (Chev. 34.907), Mali, 1.400 m. alt. Chev. 24.337, Mont Loura à 1.450 m. alt. Chev. n° 34.916.

**S. capillaris** sp. nov.

*Annua, tenuissima; radice fibrosa, culmo flagellifero ascendente, geniculato, ramuloso, 20-40 cm. alto, vaginis internodio brevioribus ad fissuras tenuissime pilosis, ligula brevissima eciliata; foliis subsetaceis, vel compresso, filiformis, erectis, 8-15 cm. longis, 1 mm. latis. Paniculæ ovatæ 10-15 cm.*

*longis, 5-8 cm. latis, laxissime patentis, sparsifloris, radiis capillaribus 2-3-nis solitariisque, inferme 1/3 nudis; pedicellis 5-10 mm.; spiculis 2 mm. longis, glaberrimis, gluma inferiore ovata acuta, valvula inferiore acuta.*

Oubangui : Région de Ouaka, environs de Gerelenji à 45 km. au N. de Bambari, pend aux rochers encaissant un ravin près des sources de la Nguéra (C. Tisserant, n° 2071),

**S. tenuis** Stapf (nomen) in Chev. Sudania, p. 79, n° 5489 (1911) nomen et Chev. Etude Fl. Afr. centr. (1913), p. 372 (nomen).

*Annua; radice fibrosa; culmo erecto tereti striato 15-25 cm. alto, vagina nulla eciliolata; foliis angustissimis carinatis, distichis, 1-3 cm. longibus tenuissime acuminatis; paniculæ jubatis spicæformæ 4-12 cm. longibus, 1-3 latis, radiis tenuis solitariis, alternis flexuosis, simplicibus, a basi floriferis; floribus densissimis sessilibus glabris, spiculis exiguis; glumis ovatis, scariosis, inæqualibus, valvulæ oblongis, acutis.*

Haut-Oubanguï, entre la moyenne Kémo et Krebedjé, sur les plateaux ferrugineux (Chev. n° 5489) 12 sept. 1902.

**S. Batesii.** sp. nov.

*Radice fibrosa et repente; culmis cæspitosis squamis numerosi basi vestitis et foliorum, fasciculis dense erexit, foliis angustis linearibus in caudam angustissimum filiformen attenuatis convolutis pungentis; vaginis ad fissuras ciliatis, strictis, glabris; ligula brevissima truncata ciliolata; thyrsi cylindracei, densissimi, angustissimi; 6-12 cm. longi, 3-6 mm. lati; radiis albidis, 1-3 nis, brevibus, erexit, simplicibus, pedicellis brevissimis; spiculis lanceolatis linearibus, acutis, 2 mm. 5 longis, glumis brevibus avatis, valculo dimidio breviore.*

Cameroun : Sanje dans le Rio Benito, croît en touffes dans les fentes des rochers formant les rapides de la rivière (G. Bates, n° 567), sept. 1897.

**S. subglobosus** Stapf. Ms ex Hutchinson et Dalziel.

*Annua; radice tenui fibrosa; culmo simplici erecto foliato; foliis plerumque planis, 3-6 cm. longis, 2-4 mm. latis, margine et intus pilis e glandulis pectinis obsitis; jubæ auguste linearis 15-22 cm. longis, 1 cm.-2 cm. 5 latis; radiis verticillatis ascendentibus; spiculis sessilis, ovoideis, violaceis, gluma inferiore pellicucida, valvulis dimidio brevioribus; caryopsi subspherici.*

Côte d'Ivoire : Baoulé, entre Diahbo et Bouaké (Chev., n° 22075).

**S. coromandelinus** Kunth. var. **senegambiae** var. nov.

*Culmis prostratis brevibus, paniculis pauciifloribus.*

Sénégal : Saint-Louis, près de l'embouchure du fleuve, sur le sable (Chev., décembre 1938).

**S. Hubbardi** sp. nov.

*Perennis. Culmo erecto tenui glabro, simplici, tripedali alti, vaginis pilosis; ligula brevissima pilosa; foliis ascendentibus, 10-15 cm. longis,*

3-6 mm. latis, scabris, eciliolatis; panicula subpyramidata 10-15 cm. longa; radiis 4-6 nis ascendentibus, a medio vel superne floriferis; spiculis breve pedicellatis linearis-oblongis, 3-4 cm. longis, 2 mm. latis; gluma inferiore lanceolato-acuminata; caryopsi oblongi apiculati.

Guinée française : Cercle de Beyla entre Diededou et Niossomidou (Chev., 20855). 28 févr. 1909.

**S. Schnellii** sp. nov.

*Annua tenuissima, culmo erecto tenui, 10-20 cm. alto, tota vaginato cum nodis glabro, ligula abbreviata eciliari, foliis tenui setaceis attenuatis rigidis glabris erectis, 1-2 cm. longis convolutis viridibus glabris; juba diffusa patentis (3-6 cm. longis, 2-3 cm. latis); radiis alternis flexuosis capillaris, solitaribus ramulosis, spiculis ovatolanceolatis 1 cm. 5 longibus, brevi pedicellatis, glumis ovatis inaequalibus inferiore flosculosso duplo breviore acuta, glumellis acutis.*

Haute-Guinée française : Marécage de bowal au Pied du Nimba (R. Schnell, n° 3426), août 1948.

**S. pauciflorus** sp. nov.

*Annua tenuissima, 5-12 cm. alta; culmo erecto filiformi, simplici, uti tota planta glabra; foliis brevibus setaceis erectis, ligula nulla; panicula effusa coarctata filiformi, 1-2 cm. longis; spiculis brevi pedicellatis vel sessilibus, solitariis, alternis, glumis subaequalibus, scariosis, oblongibus truncatis vel obtusibus; glumis lanceolatis acutis; caryopsi ovata.*

Haut-Guinée : marécage de bowal, au pied du Nimba (R. Schnell, n° 3437), août 1947.

ERAGROSTIS P. Beauv.

**E. nigerica** sp. nov.

*Annua, gracilis; radice fibrosa; culmis erectis, gracilibus, 10 cm.-40 cm. altis, vaginis glabris vel hirsutis, ore piloso; laminis angustis involutis, subulatis, 2-15 cm. longis; panicula elongatae 4-20 cm. longis, 1 cm.-1 cm. 5 latis, strictae, angustissimae, radiis subverticillatis, erectis, adpressis inaequalibus, ramosis; pedicellis brevissimis; spiculis linearis, 6-12 mm. longis, 1 mm.-1 1/2 latis, acutis, 4-16 floribus; glumis lanceolatis acutis, valvula exteriore carinata acuta.*

Soudan français : commun sur les bancs de sable dans le lit du Niger, après le retrait des eaux entre Tombouctou et Siguiri. San, bords du Bani (Chev., n° 1093, type); Djenné (Chev., n° 1120). Rives du lac Faguibine (A. Leclercq in Hb. Chev., n° 42585 bis).

**E. dakarensis** sp. nov.

*Annua. Radice fibrosa proferante culmos dense fasciculatos geniculato ascendentes, simplicibus glabris; vaginis striatis glabris ore sparsim barbatis vel nudis; ligula brevissima; foliis angusto linearibus subulatis,*

*rigidis rectis, longis, glabris basi superiore pubescentibus. Paniculæ amplæ pyramidato-patentæ; radiis remotis solitariis vel binis, radiolisque capillaribus in petiolos base nudis in axis dilatatis, spiculis linearibus 5-11 floribus; glumis inæqualibus ovatis, acutis; glumella inferiore ovata acuminata, obscure nervata (pellucidula) carina virida; seminibus ovoideis, rufis.*

Sénégal : environs de Dakar et presqu'île du Cap, sur le sable, au bord des petites mares desséchées. Coll. A. Chev., janv.-févr. 1945 !

**E. sudanica** sp. nov.

*Perennis. Radice fibrosa cæspitifera; culmo eretto elongato (80 cm. alto et ultra); vaginis strictis, laxis, ligula setuloso ciliata, foliis erectis, rigidis convoluto-setaceis, 15-35 cm. longis, linearibus canaliculatis, basi superiore tomentosis, paniculæ diffusæ erectæ, vel contractæ, axis puberulis-scabriusculis, radiis nunc solitariis, nunc subverticillatis, erector-patulis, spiculis lanceolatis 5-9 floribus, prompte caducis, glumis ovato-lanceolatis, acutis inæqualibus; glumella inferiore ovata abbreviato acuta carina scabra.*

Soudan français : Bamako sur les bords du Niger, Chev., n° 233, Coll. 20 janvier 1899.

**E. fleuryi** sp. nov.

*Perennis. Radice fibrosa cæspitosa; culmo basi subbulbosa incrassata; foliis radicalibus dense aggregatis, abbreviatis, angusto linearis strictis rigidis acumine subpungente, pubescentibus margine scaberrimis; culmis brevibus, 8-12 cm. altis scabris; vaginæ hirsutæ; ligula brevissima pilosiuscula; panicule spiciformæ, paucifloræ, 2 cm. 5-5 cm. longæ; radiis solitariis alternis; spiculis 4-6 ovato-oblongis, 6-10 mm, longis, 2-3 mm. 5 latis, acutis, 8-12 floribus, subsessilibus, glabris; glumis subæqualibus, ovato acuminatis, margine hyalinis; glumellis externis ovato-lanceolatis, apicem versus scabra.*

Guinée française : entre Diankoro et Balandougou, vers 1.000 m. alt. sur le terreau noir recouvrant les bowals (Chev., n° 25882), coll. 24 mai 1912. Espèce dédiée à mon excellent compagnon d'Afrique François Fleury.

**E. georgi** sp. nov.

*Perennis, cæspitosa rhizomata, perpendiculariter descente inter rupestris inundatis; culmo substricto eretto, tereti levissimo simplici; vaginis internodio brevioribus glabris striatis, radicalibus in fibras tenaces solutis ligula densum pilorum tomentum lincale, foliis setaceis, rigidis, distichis angustissimis, erectis, glabris; paniculæ jubatis spicæformis capillaris erectæ; radiis solitaribus alternis flexuosis; (glumis... glumellis); spiculis linearibus glabris, acutiusculis 15-25 mm. longis, 20-30 floribus acuminatis, glumella inferiore oblongo-lanceolata, glaberrima.*

Gabon : Mayombe bayaka rapides de la Nyanga, entre Liganda et Digoungou. Georges Le Testu, n° 1597, 18 août 1910.

**E. vinicolor** sp. nov.

*Annua. Radice fibrosa; culmis rectis 30-40 cm. altis; vaginis ore barbatis; ligula brevissima, foliis setaceis, angustissimis planis vel convolutis glabris, erectis, paniculæ erectæ radiis nunc solitariis, nunc subverticillatis erectis, spiculis parvis oblongolinearibus acutis, longe-pedicellatis 4-10 floribus levissimis compressis; valvula inferiore nitidula enervia margine pellucido subobtuso, superiore æquilonæ tenuissime serrulata.*

Soudan français : Balandougou (Chev., 309), Haute-Volta : entre Bobo-Dioulasso et Banfora, janv. 1948 !

**E. vinivolor** var. **pallida** var. nov.

*Cæspitosa multicaulis, culmis 40-50 cm. altis; foliis planis, 2 mm. latis, basi hirsuti. Panicula floribunda, 8-15 cm. longi; spiculis decoloribus.*

Côte d'Ivoire : Bouaké dans les anciennes jachères, sur sol sablonneux (Chev.), janvier 1948.

**Z. pumila** sp. nov.

*Radice fibrosa; culmo simplici striato, tereti, stricto glabro, 10-15 cm. alto; foliis paucis, parvis, setaceis, ad faucem barbatis, cæterum glabris, limbis convolutis erectis, culmo subbrevibus; panicule erectæ, strictæ contractæ; radiis verticillatis, ramosis erectis, brevibus adpressis ramosis, alternis confectis spiculis, alteris ovoïdeis, 3-6 filoribus, alteris linearibus 20-40 floribus; glumis acutis pellucides volvulis oblongis.*

Soudan français : Farako, dans le marais (Chevalier, n° 44089 bis), 23 mars 1932.

**E. dumasiana** sp. nov.

*Perennis. Radice fibrosa, dense cæspitifera; culmi simplici striato tereti stricto glabro, 30 cm. alto et ultra, basi præsertim foliato; foliis glaucis linearibus subconvolutis glabris, ascendentibus, basi pilosis, vaginis striatis, ore pilosis. Panicula erecta racemoso-decomposita patente; radiis solitariis alternis hic inde divisitis, pedicellis unispiculatis, spicula longiores formatis; spiculis lanceolatis linearibus, violaceis, acutis 6-12 floribus, 3-5 mm. longis, 1 mm. 5 latis, subacutis; glumis inæqualibus lauceolatis acuminatis, valvula ovato-lanceolata.*

Soudan français : Balandougou, dans le cercle de Siguiri (Chevalier, n° 309), 6 février 1899.

**E. fluviatilis** sp. nov.

*Perennis; radice fibrosa et stolonifera, culmis variabilibus, nunc erectis, fertilibus, nunc decumbentibus, sterilibus, geniculatis, in finis radicentibus; culmo erecto stricto glabro, sterile sarmente et decumbente, fertile robusto, vigido, 40 cm-100 cm. alto; foliis glaucis fasciculorum sataceis, strictuisculis, culmeis, angustissimis, planiusculis, apice convoluto setaceo-acuminatis basi interne pilosis, deorsum asperiusculis; vaginis glabris striatis, ore pilosis, ligulis brevissimis barbatis. Panicula erecta, ampla, diffusa; radiis solitariis,*

*alternis, crecto-patentibus; radiolis (pedicellis) tenuissimis, capillaribus, longissimis flexuosis; spiculis imbricatis distantibus oblongo-lincolaribus, subacutis, 5-10 floribus flosculis oblongo-lanccolatis, subacutis; glumis deciduis angustis acuminatis, truncatis, parum inæqualibus, carina scabris; valvula inferiore glaberrima nitida; seminibus subrotundis.*

Soudan français : rapides du Niger en amont de Bamako vers Quignola. Chev., n° 254, 21 janvier 1899. Basse-Côte d'Ivoire : lit du Bandama, près Tiassalé, dans les rochers submergés une partie de l'année et sur les banes de sable. Coll. Chev., février 1948 !

**E. halophila** sp. nov.

*Perennis. Radice fibrosa, dense cæspitifera; culmo robusto, crecto, elongato (1 m. alto) uti tota planta glaucescente et puberule; culmo rigido 3-5 mm. diametro; foliis linearibus linearo-angustis, acutis, glaucis, pilosis margine retrorum scabriulis; ligula pilose, vaginis striatis laxis glabriusculis; foliis acutis, glaucis; paniculi gracili lineare, clongata, distantiflora, strictæ radiis solitariis vel fasciculata basi vel prope a basi subracemiformi compositis floriferis, pedicellis brcvibus vclutinis, fasciculatis; spiculis vernalis linearibus 1 cm.-4 cm. longis, 30-60 floribus; spiculis serotinis (*hycomalis*) solitariis ovatis vel-oblongis, 4-10 mm. longis, 3-10 floribus, glumis oblongis acutis trinerviis carina herbacea margine hyalino-membranacea valvula inferiore compressa oblongo-acuminata; caryopsi minima subrotunda rufa.*

Sénégal : Kaolaek, sur les terrains salés à proximité de la mer. Fév. 1945. Coll. Chevalier.

**E. maritima** sp. nov.

*Annua; radice fibrosa; culmis basi geniculatis tunc crectis strictis uti tota planta glabris; vaginis striatis; ligula brevi ciliolata; foliis linearibus planis, retrorsum scabriusculis, 6-25 cm. longis, 3-6 mm. latis; panicula rigidis pyramidalis, 6-25 cm. longis, 1-6 cm latis; radiis verticillatis, ramosissimis; spiculis tenuibus distichis, glomeratis, 2-5 mm. longis, fulvo-brunneis, flosculis sæpe viviparibus, carinæ sæpius setuloso-lacræ, glumis inferioribus ovato-acuminatis ad margines pellucidis.*

Sénégal : Mbidjem, dans les Nyayes (Chev., n° 2232); terrains saumâtres près de Fadiout (Ezanno, n° 29).

**E. turgida** De Wild. var. **ivorensis** var. nov.

*Diftiert a typo foliis radicalis ciliolatis, paniculis contractis, spiculis sessilibus.*

Haute Côte d'Ivoire : savane au confluent du Sassandra et du Bafing (Chev., n° 21772).